

Первая помощь

Первая помощь, если ребенок заболел ротавирусной инфекцией:



- оставить дома;
- вызвать врача;
- начать отпаивание водой, по 1–2 чайные ложки каждые 5–10 минут;
- нельзя кормить насильно, при улучшении состояния предложите рисовый отвар, сухарики, жидкую кашу на воде;
- сбивать температуру при плохой переносимости.



Чего не стоит делать при ротавирусной инфекции:

- давать ребенку молоко, соки, газировку;
- без назначения врача давать противорвотные, противодиарейные средства и антибиотики.



Ротавирусная инфекция



Симптомы

Ротавирусная инфекция – это инфекционное заболевание, которое вызвано ротавирусами, является наиболее частой причиной диареи у детей.

Симптомы ротавирусной инфекции у ребенка:

- внезапный подъем температуры до 38–39 °С;
- рвота;
- водянистый стул желтого цвета, с резким кислым запахом, до 10–20 раз в сутки;
- схваткообразные боли в животе;
- сильная слабость.



Профилактика

Профилактика ротавирусной инфекции



- мыть руки с мылом после улицы, туалета, перед едой;
- тщательное мытье фруктов, овощей, ягод;
- использование кипяченой или бутилированной воды;
- влажная уборка дома;
- если ребенок заболел – оставьте его дома, чтобы не подвергать опасности других.

